



56 Market St • 970-328-1116 • office@castlepeakdental.com

## **Instrucciones despues de la preparacion de la corona**

Los dientes y/o encias pueden estar sensibles de 4 a 5 dias despues de la preparacion de la corona. Motrin/Advil es lo mejor que puede tomar los primeros dias despues de su cita. Porfavor llamenos si la sensibilidad no se mejora. Despues de cualquier procedimiento dental incluyendo la preparacion de la corona los dientes pueden llegar a necesitar endodoncia.

Si su corona temporal no esta modificada apropiadamente, porfavor llamenos para hacer los ajustes necesarios. Si su corona temporal se fractura, llamenos para fabricarle una corona temporal nueva. Puede usted ir a su farmacia local y comprar pegamento para coronas temporal llamado (DenTek) si su corona se afloja. Si pierde su corona los dientes vecinos se empiezan a mover y la corona permanente puede que no le quede correctamente. Si una corona nueva tiene que ser fabricada debido a la perdida prematura de la corona temporal , entonces el costo adicional es su responsabilidad.

Se recomienda evitar masticar chicle y comida pegajosa, ya que pueden resultar en la perdida de la corona temporal. Si un diente de enfrente fue el que se preparo para la corona, es muy importante que no muerda comidas muy duras o pegajosas con los dientes de enfrente.

Porfavor llamenos si tiene alguna pregunta.

**Si tiene alguna pregunta por favor llame a Brittany al 970-328-1116**